

CSAK rugalmasan

A lábszárfekélyek leggyakoribb oka a vénás eredetű keringészavar.

A betegség jellegzetessége, hogy a vénás vér pang a lábak, bokák és lábszárak területén, ez vizenyőt, ödémát okoz, ami rontja a szövetek oxigénellátását, elősegíti a fekély kialakulását, és gátolja a krónikus fekély begyógyulását.

A vizenyőt tehát **el kell távolítani** a szövetekből, és ebben az esetben erre **nem a vízhajtó a jó megoldás!**

A vénás eredetű fekélyes lábszárat **fáslizni kell!** Lehetőleg **rövid megnyúlású fáslival**. Annak nagyobb ugyanis az úgynevezett munkanyomása, ami azt jelenti, hogy **járás közben** a lábszárizmok nem tudják a rövid megnyúlású fáslit annyira megnyújtani, mint a kevésbé rugalmas, kevésbé ellenálló, úgynevezett hosszú megnyúlású fáslit. Így járás közben a rövid megnyúlású fásli nagyobb nyomást gyakorol a szövetekre, és ezzel több folyadékot ürít ki onnan, megszüntetve ezáltal **a fekély gyógyulását gátló egyik tényezőt, a vizenyőt.**

Ne feledje:

- a vénás fekély csak fáslival gyógyul,
- mert a sebgyógyulást gátló ödémát meg kell szüntetni,
- ehhez lehetőleg rövid megnyúlású rugalmas pólyát használjon,
- ami sokkal hatékonyabb járás közben.

GYÓGYÍTSUK BE EGYÜTT A LÁBSZÁRFEKÉLYÉT!

www.sebkezelesotthon.hu

dr. Kökény Zoltán

Sebkezelő központ, 1188 Budapest, Nemes u. 18-20.

Bejelentkezés: 0620-485-9191

© Dictum Kft., dr. Kökény Zoltán

