

Minden perc számít!

A láb megmentése érdekében az időtényező nagyon fontos!

A láb speciális anatómiai felépítése miatt a fertőzések nagyon gyorsan a mély szövetekre terjedhetnek. Ez akár órák, egy-két nap alatt bekövetkezhet. A mélybe jutó fertőzés az inak, ínhüvelyek, az erek mentén, a nyirokkeringés segítségével gyorsan szétterjed, a járkálás hatására olykor a magasabb területek felé.

A gyulladás helyi tünetei a **bőrpír**, a **bőr kimelegedése**, a **duzzanat** és a **fájdalom**. A fájdalom gyakran lüktető, és a végtag lógatásakor fokozódik, felpolcolásakor csökken. Ha a bőrpír terjed, a fájdalom fokozódik, megjelennek a fertőzés általános tünetei, a **láz**, **hidegrázás**, a **rossz közérzet**.

A fertőzés megelőzésének legjobb módja, ha a cukorbeteg a legkisebb sebbel is azonnal szakorvoshoz fordul! De ha a fertőzés bekövetkezik, akkor már nem húzhatja tovább az időt! Ez a végtag elvesztéséhez vezethet!

MENTSE MEG LÁBÁT AZ AMPUTÁCIÓTÓL!

www.sebkezelesotthon.hu

dr. Kökény Zoltán

Sebkezelő központ, 1188 Budapest, Nemes u. 18-20.

Bejelentkezés: 0620-485-9191

© Dictum Kft., dr. Kökény Zoltán

